

## ■ワクチン接種の判断について（接種済者・未接種者別）

## ●全体

	接種済者				未接種者			
	生徒		保護者		生徒		保護者	
	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)
かなり悩んだ	50	10.4	122	25.0	26	39.4	46	66.7
まあまあ悩んだ	76	15.8	69	14.1	13	19.7	13	18.9
少し悩んだ	139	28.8	143	29.3	9	13.6	5	7.2
悩まなかった	217	45.0	154	31.6	18	27.3	5	7.2
計	482		488		66		69	

## ●男子

	接種済者				未接種者			
	生徒		保護者		生徒		保護者	
	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)
かなり悩んだ	15	7.6	48	24.1	9	39.2	15	60.0
まあまあ悩んだ	30	15.1	20	10.0	5	21.7	7	28.0
少し悩んだ	53	26.8	67	33.7	5	21.7	1	4.0
悩まなかった	100	50.5	64	32.2	4	17.4	2	8.0
計	198		199		23		25	

## ●女子

	接種済者				未接種者			
	生徒		保護者		生徒		保護者	
	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)
かなり悩んだ	23	11.2	51	24.5	13	46.4	21	72.4
まあまあ悩んだ	26	12.7	33	15.9	5	17.9	4	13.8
少し悩んだ	65	31.7	57	27.4	2	7.1	1	3.5
悩まなかった	91	44.4	67	32.2	8	28.6	3	10.3
計	205		208		28		29	

●1年生

	接種済者				未接種者			
	生徒		保護者		生徒		保護者	
	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)
かなり悩んだ	21	12.9	45	27.8	14	56.0	18	66.7
まあまあ悩んだ	24	14.7	21	13.0	3	12.0	2	7.4
少し悩んだ	45	27.6	53	32.7	3	12.0	3	11.1
悩まなかった	73	44.8	43	26.5	5	20.0	4	14.8
計	163		162		25		27	

●2年生

	接種済者				未接種者			
	生徒		保護者		生徒		保護者	
	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)
かなり悩んだ	10	6.6	34	21.5	7	33.3	14	63.6
まあまあ悩んだ	26	17.1	22	13.9	3	14.3	7	31.8
少し悩んだ	45	29.6	47	29.8	3	14.3	1	4.6
悩まなかった	71	46.7	55	34.8	8	38.1	0	0.0
計	152		158		21		22	

●3年生

	接種済者				未接種者			
	生徒		保護者		生徒		保護者	
	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)
かなり悩んだ	19	11.4	43	25.6	5	25.0	14	70.0
まあまあ悩んだ	26	15.6	26	15.5	7	35.0	4	20.0
少し悩んだ	49	29.3	43	25.6	3	15.0	1	5.0
悩まなかった	73	43.7	56	33.3	5	25.0	1	5.0
計	167		168		20		20	

■未接種の方の、今後のワクチン接種判断について

	人数	左の主な内訳1		左の主な内訳2			割合(%)
		男子	女子	1年	2年	3年	
接種予約済	24	7	4	13	10	1	26.4
接種を悩んでいる	38	10	18	12	17	9	41.7
今後も接種しない	22	11	5	11	7	4	24.2
接種できない	7	3	2	2	1	4	7.7
計	91	31	29	38	35	18	

※「今後も接種しない」には「今は接種しない」という回答が含まれており、「国産ワクチンを待つ」といった記入もありました。

※接種・未接種に回答せず、この項目のみ回答された方のデータを反映したため、未接種者集計数と合致していません。

■ワクチン接種後の副反応について（接種済者のうち、副反応を自覚した方の割合）

●男子

項目		ワクチン接種1回目(%)				ワクチン接種2回目(%)			
		当日	翌日	翌々日	以降	当日	翌日	翌々日	以降
発熱	微熱(37.4以下)	26.9	23.9	21.3	19.8	21.0	14.9	21.0	21.0
	37.5~37.9	3.0	9.1	1.5	0.0	7.7	24.1	9.2	1.5
	38.0~38.4	0.5	3.0	0.5	0.0	1.5	10.3	3.6	0.0
	38.5~38.9	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	9.2	1.0	0.0
	39.0~39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.1	0.5	0.0
	39.4以上	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0
	合計	30.5	37.6	23.9	19.8	31.8	65.1	35.4	22.6
	解熱剤の服用	1.0	5.6	0.0	0.0	4.1	18.5	3.6	0.5
接種部が赤くなる		10.2	14.2	7.6	3.0	9.7	13.3	6.7	3.6
接種部の痛み		56.9	73.1	33.5	9.6	49.2	69.7	29.7	10.3
接種部のかゆみ		4.1	5.1	4.1	4.6	4.1	7.2	4.6	3.1
接種部がはれる		17.3	20.3	7.6	3.0	11.8	19.0	9.2	3.1
身体がほてる		0.5	4.1	1.5	0.0	3.6	10.8	2.6	0.5
倦怠感		6.6	11.7	5.6	1.0	9.2	31.3	13.8	3.1
さむけ		1.0	0.5	0.5	0.0	2.6	7.7	1.5	0.5
関節痛		1.0	3.0	1.5	1.0	2.6	6.7	2.6	1.5
頭痛		4.6	9.6	3.6	1.5	8.7	29.7	12.3	3.6
吐き気		1.0	1.5	0.5	0.5	0.5	5.6	1.5	0.0
嘔吐		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0
鼻水		0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢		0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.1	1.5	0.0

## ●女子

項目		ワクチン接種1回目(%)				ワクチン接種2回目(%)			
		当日	翌日	翌々日	以降	当日	翌日	翌々日	以降
発熱	微熱(37.4以下)	37.6	38.5	34.1	31.2	35.2	22.6	26.1	30.7
	37.5~37.9	2.4	5.9	0.5	0.0	7.0	20.1	7.0	0.0
	38.0~38.4	0.5	1.0	0.5	0.0	2.0	14.6	2.0	0.5
	38.5~38.9	1.0	1.5	0.0	0.0	1.0	10.6	0.5	0.0
	39.0~39.4	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	2.5	0.0	0.0
	39.4以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.5	1.0	0.0
	合計	41.5	47.3	35.1	31.2	46.7	72.9	36.7	31.2
	解熱剤の服用	2.4	2.4	1.0	0.0	4.5	15.1	2.5	0.0
接種部が赤くなる		12.7	12.7	6.8	4.4	9.5	14.6	6.5	4.0
接種部の痛み		65.9	78.5	41.0	10.2	55.3	64.3	36.2	10.6
接種部のかゆみ		5.9	8.8	6.3	4.9	3.5	9.5	6.0	4.5
接種部がはれる		20.0	25.4	11.2	4.4	16.6	23.6	11.6	3.5
身体がぼてる		2.4	2.9	0.0	0.0	5.5	9.0	2.0	0.0
倦怠感		10.7	13.2	5.9	0.5	11.6	37.7	10.1	4.0
さむけ		2.4	2.0	0.0	0.0	4.5	13.1	1.5	0.5
関節痛		3.4	5.4	2.0	1.0	4.5	15.6	4.0	1.5
頭痛		4.9	11.7	3.4	0.5	11.1	39.7	10.6	2.0
吐き気		0.5	1.0	0.5	0.0	1.5	6.0	1.0	0.0
嘔吐		0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0
鼻水		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5
下痢		1.0	0.5	1.0	0.5	1.5	2.5	1.0	1.0

●副反応の男女間比較（倍率：女子③/男子②）

項目		ワクチン接種1回目				ワクチン接種2回目			
		当日	翌日	翌々日	以降	当日	翌日	翌々日	以降
発熱	微熱(37.4以下)	1.40	1.62	1.60	1.58	1.67	1.52	1.24	1.46
	37.5~37.9	0.80	0.64	0.32		0.91	0.83	0.76	
	38.0~38.4	0.96	0.32	0.96		1.31	1.42	0.56	
	38.5~38.9		2.88			1.96	1.14	0.49	
	39.0~39.4					1.96	0.49	0.00	
	39.4以上					0.98	1.63		
	合計	1.36	1.26	1.47	1.58	1.47	1.12	1.04	1.38
	解熱剤の服用	2.40	0.44			1.10	0.82	0.70	
接種部が赤くなる		1.25	0.89	0.90	1.44	0.98	1.09	0.98	1.12
接種部の痛み		1.16	1.07	1.22	1.06	1.12	0.92	1.22	1.03
接種部のかゆみ		1.44	1.73	1.56	1.07	0.86	1.33	1.31	1.47
接種部がはれる		1.16	1.25	1.47	1.44	1.41	1.24	1.25	1.14
身体がぼてる		4.80	0.72			1.54	0.84	0.78	
倦怠感		1.63	1.13	1.05	0.48	1.25	1.20	0.73	1.31
さむけ		2.40	3.84			1.76	1.70	0.98	0.98
関節痛		3.36	1.76	1.28	0.96	1.76	2.34	1.57	0.98
頭痛		1.07	1.21	0.96	0.32	1.27	1.33	0.86	0.56
吐き気		0.48	0.64	0.96	0.00	2.94	1.07	0.65	
嘔吐							0.98		
鼻水									
下痢							1.22	0.65	

## ●1年生

項目		ワクチン接種1回目(%)				ワクチン接種2回目(%)			
		当日	翌日	翌々日	以降	当日	翌日	翌々日	以降
発熱	微熱(37.4以下)	35.6	36.2	28.2	27.0	25.8	17.0	23.9	27.7
	37.5~37.9	1.2	4.9	1.2	0.0	9.4	22.6	6.3	0.0
	38.0~38.4	1.2	0.6	0.6	0.0	1.3	14.5	1.9	0.0
	38.5~38.9	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	6.3	1.3	0.0
	39.0~39.4	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	4.4	0.6	0.0
	39.4以上	0.0	0.6	0.0	0.0	1.3	1.9	0.0	0.0
	合計	38.0	44.2	30.1	27.0	37.7	66.7	34.0	27.7
	解熱剤の服用	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
接種部が赤くなる		11.7	11.7	6.1	2.5	8.2	12.6	5.0	3.1
接種部の痛み		59.5	78.5	35.0	8.0	50.9	62.3	31.4	6.9
接種部のかゆみ		4.9	9.2	6.1	4.9	3.8	10.1	5.7	4.4
接種部がはれる		19.0	23.3	10.4	5.5	11.9	21.4	9.4	3.8
身体がほてる		1.8	3.1	0.6	0.0	4.4	8.8	3.1	0.6
倦怠感		7.4	11.7	4.9	0.6	8.2	28.3	11.9	3.1
さむけ		0.6	1.2	0.6	0.0	1.9	7.5	0.6	0.6
関節痛		0.6	3.7	0.0	0.0	2.5	9.4	2.5	1.3
頭痛		1.2	8.0	1.8	0.6	6.9	30.2	10.1	2.5
吐き気		0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	3.8	0.0	0.0
嘔吐		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
鼻水		0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	1.3	0.0	0.6
下痢		0.0	0.6	0.0	0.0	1.3	2.5	0.6	0.6

■2年生

項目		ワクチン接種1回目(%)				ワクチン接種2回目(%)			
		当日	翌日	翌々日	以降	当日	翌日	翌々日	以降
発熱	微熱(37.4以下)	35.8	31.1	32.5	28.5	29.9	16.3	21.8	26.5
	37.5~37.9	5.3	9.3	1.3	0.0	6.1	20.4	12.2	1.4
	38.0~38.4	0.0	4.6	0.7	0.0	2.0	13.6	4.1	0.0
	38.5~38.9	0.7	0.7	0.0	0.0	1.4	13.6	0.0	0.0
	39.0~39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
	39.4以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	0.7	0.0
	合計	41.7	45.7	34.4	28.5	42.2	68.7	38.8	27.9
	解熱剤の服用	2.6	6.0	0.7	0.0	4.1	15.0	3.4	0.0
接種部が赤くなる		13.9	13.2	6.6	2.6	10.9	12.9	6.1	4.1
接種部の痛み		64.2	77.5	42.4	12.6	57.1	69.4	32.7	12.2
接種部のかゆみ		4.6	7.3	6.6	3.3	2.0	7.5	4.1	2.7
接種部がはれる		18.5	23.8	10.6	2.6	16.3	19.7	10.9	2.0
身体がぼてる		0.0	4.0	0.7	0.0	4.8	10.2	2.0	0.0
倦怠感		10.6	11.3	6.6	0.7	14.3	34.7	13.6	4.8
さむけ		3.3	1.3	0.0	0.0	6.8	10.9	1.4	0.0
関節痛		3.3	6.6	3.3	2.0	5.4	13.6	2.7	1.4
頭痛		9.9	12.6	6.0	1.3	13.6	38.1	12.9	2.0
吐き気		1.3	0.7	0.0	0.0	1.4	8.2	2.0	0.0
嘔吐		0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	0.0	0.0
鼻水		0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0
下痢		1.3	1.3	1.3	0.7	0.7	2.0	1.4	0.7

■3年生

項目		ワクチン接種1回目(%)				ワクチン接種2回目(%)			
		当日	翌日	翌々日	以降	当日	翌日	翌々日	以降
発熱	微熱(37.4以下)	29.6	29.0	26.0	24.9	26.4	23.9	24.5	22.7
	37.5~37.9	1.8	8.9	0.6	0.0	6.7	20.9	4.9	0.6
	38.0~38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	12.3	2.5	0.6
	38.5~38.9	0.6	0.6	0.6	0.0	1.2	9.2	1.2	0.0
	39.0~39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0
	39.4以上	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.8	0.6	0.0
	合計	32.0	39.1	27.2	24.9	36.2	72.4	33.7	23.9
	解熱剤の服用	0.6	0.6	0.0	0.0	3.7	19.6	2.5	0.0
接種部が赤くなる		10.1	15.4	8.9	5.3	10.4	16.6	8.6	4.9
接種部の痛み		56.2	68.0	34.9	9.5	42.3	61.3	32.5	12.3
接種部のかゆみ		5.3	6.5	4.7	4.7	5.5	8.0	6.1	3.7
接種部がはれる		18.3	23.1	7.7	4.1	13.5	20.9	9.2	4.9
身体がほてる		2.4	3.6	0.6	0.0	4.9	10.4	0.6	0.0
倦怠感		6.5	11.8	4.1	1.2	8.6	37.4	8.6	1.8
さむけ		0.6	1.8	0.6	0.0	3.7	14.1	2.5	0.6
関節痛		2.4	1.8	2.4	0.6	1.8	12.9	3.7	1.2
頭痛		1.8	11.8	3.0	1.2	7.4	36.8	10.4	2.5
吐き気		0.6	2.4	1.2	0.0	1.8	6.7	1.2	0.0
嘔吐		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
鼻水		0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
下痢		0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.5	1.2	0.0

■ 1回目接種で発熱が無かった方の2回目の発熱状況

男性	女性	不明	計
117	105	43	265

		発症人数				割合(発症人数/人数)			
		当日	翌日	翌々日	以降	当日	翌日	翌々日	以降
男子生徒	微熱(37.4以下)	4	14	9	5	3.4	12.0	7.7	4.3
	37.5-37.9	3	23	7		2.6	19.7	6.0	0.0
	38度未満計	7	37	16	5	70.0	<b>62.7</b>	76.2	100.0
	38.0-38.4	3	7	2		2.6	6.0	1.7	0.0
	38.5-38.9		7	2		0.0	6.0	1.7	0.0
	39.0-39.4		6	1		0.0	5.1	0.9	0.0
	39.5以上		2			0.0	1.7	0.0	0.0
	合計	10	59	21	5	8.5	50.4	17.9	4.3
女子生徒	微熱(37.4以下)	11	15	4	4	10.5	14.3	3.8	3.8
	37.5-37.9	6	15	4		5.7	14.3	3.8	0.0
	38度未満計	17	30	8	4	81.0	<b>53.6</b>	88.9	100.0
	38.0-38.4	2	14	1		1.9	13.3	1.0	0.0
	38.5-38.9	1	9			1.0	8.6	0.0	0.0
	39.0-39.4	1	1			1.0	1.0	0.0	0.0
	39.5以上		2			0.0	1.9	0.0	0.0
	合計	21	56	9	4	20.0	53.3	8.6	3.8
性別不明	微熱(37.4以下)	1	4	1	2	2.3	9.3	2.3	4.7
	37.5-37.9	1	5	3		2.3	11.6	7.0	0.0
	38度未満計	2	9	4	2	50.0	40.9	80.0	100.0
	38.0-38.4	1	10	1		2.3	23.3	2.3	0.0
	38.5-38.9		2			0.0	4.7	0.0	0.0
	39.0-39.4					0.0	0.0	0.0	0.0
	39.5以上	1	1			2.3	2.3	0.0	0.0
	合計	4	22	5	2	9.3	51.2	11.6	4.7
合計	微熱(37.4以下)	16	33	14	11	6.0	12.5	5.3	4.2
	37.5-37.9	10	43	14	0	3.8	16.2	5.3	0.0
	38度未満計	26	76	28	11	74.3	<b>55.5</b>	<b>80.0</b>	100.0
	38.0-38.4	6	31	4	0	2.3	11.7	1.5	0.0
	38.5-38.9	1	18	2	0	0.4	6.8	0.8	0.0
	39.0-39.4	1	7	1	0	0.4	2.6	0.4	0.0
	39.5以上	1	5	0	0	0.4	1.9	0.0	0.0
	合計	35	137	35	11	13.2	<b>51.7</b>	13.2	4.2

※割合の「38度未満計」のみ、発熱者に対する比率を表しています

■ 1回目接種で発熱があった方の2回目の発熱状況

男性	女性	不明	計
82	106	40	228

		発症人数				割合(発症人数/人数)			
		当日	翌日	翌々日	以降	当日	翌日	翌々日	以降
男子生徒	微熱(37.4以下)	37	15	32	36	45.1	18.3	39.0	43.9
	37.5-37.9	12	24	11	3	14.6	29.3	13.4	3.7
	38度未満計	49	39	43	39	94.2	57.4	89.6	100.0
	38.0-38.4		13	5		0.0	15.9	6.1	0.0
	38.5-38.9	1	11			1.2	13.4	0.0	0.0
	39.0-39.4	1	4			1.2	4.9	0.0	0.0
	39.5以上	1	1			1.2	1.2	0.0	0.0
	合計	52	68	48	39	63.4	82.9	58.5	47.6
女子生徒	微熱(37.4以下)	59	30	48	57	55.7	28.3	45.3	53.8
	37.5-37.9	8	25	10		7.5	23.6	9.4	0.0
	38度未満計	67	55	58	57	93.1	61.8	90.6	98.3
	38.0-38.4	2	15	3	1	1.9	14.2	2.8	0.9
	38.5-38.9	1	12	1		0.9	11.3	0.9	0.0
	39.0-39.4	1	4			0.9	3.8	0.0	0.0
	39.5以上	1	3	2		0.9	2.8	1.9	0.0
	合計	72	89	64	58	67.9	84.0	60.4	54.7
性別不明	微熱(37.4以下)	16	12	16	16	40.0	30.0	40.0	40.0
	37.5-37.9	5	8	1		12.5	20.0	2.5	0.0
	38度未満計	21	20	17	16	95.5	64.5	89.5	100.0
	38.0-38.4		4	1		0.0	10.0	2.5	0.0
	38.5-38.9	1	4	1		2.5	10.0	2.5	0.0
	39.0-39.4		2			0.0	5.0	0.0	0.0
	39.5以上		1			0.0	2.5	0.0	0.0
	合計	22	31	19	16	55.0	77.5	47.5	40.0
合計	微熱(37.4以下)	112	57	96	109	49.1	25.0	42.1	47.8
	37.5-37.9	25	57	22	3	11.0	25.0	9.6	1.3
	38度未満計	137	114	118	112	93.8	60.6	90.1	99.1
	38.0-38.4	2	32	9	1	0.9	14.0	3.9	0.4
	38.5-38.9	3	27	2		1.3	11.8	0.9	0.0
	39.0-39.4	2	10			0.9	4.4	0.0	0.0
	39.5以上	2	5	2		0.9	2.2	0.9	0.0
	合計	146	188	131	113	64.0	82.5	57.5	49.6
※割合の「38度未満計」のみ、発熱者に対する比率を表しています									